



تورم جوانه ها



پس از گل دهی



تشکیل میوه



رشد میوه ها



قبل از رسیدن میوه



پس از برداشت

بالانس

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (فروت ست)

گرین کال

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (رشد حبه ها)

بیوکسی بور

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (افزایش تلقیح)

بیوکسی ۴ گانه

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین Zn, Cu, Mn, Mg)

ایتیمار

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (درشتی، یکدستی و رنگ گیری انگور)

آمینون میکرو

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین اسید آمینه + تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

بیوکسی روی

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تولید حبه های کشیده انگور)

محلول پاشی ۲-۱ در هزار

سولوپتاس مدیفر



با آبیاری ۲۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار (۳ مرحله به فاصله ۱۵ روز)

ماکسیفوس کلسیم

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین P و Ca، رفع تنش و بیماری قارچی)

آهن گرین فی



با آبیاری ۷۰-۳۰ گرم / درخت (بستگی به سن، اندازه و بار درخت)

ماکسی پلنت هیومیک

با آبیاری ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار (اصلاح خاک، ریشه زایی و افزایش جذب مواد غذایی)