



تهیه نشاء



رشد بوته ها



گلهی و تشکیل میوه



رشد میوه ها



پس از برداشت



رانرگیری

آمینون رای

با آبیاری (۲-۱ در هزار)

گرین کال

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (گل دهی، رشد میوه ها و تامین کلسیم)

بالانس

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (فروت ست، افزایش گل دهی)

بیوکسی بور

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تلقیح عالی، تولید میوه های خوش فرم)

ماکسیفوس کلسیم

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین کلسیم، جلوگیری از ریزش گل و میوه، کاهش بیماری)

آمینون مار

محلول پاشی ۱ در هزار (ایجاد رانر)

بیوکسی میکس

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

سولویتاس مدیفر



با آبیاری ۳-۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع (تکرار هر ۱۵ روز)

آمینون فورت

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین اسید آمینه+ افزایش رشد بوته و گلدهی)

محلول پاشی ۱ در هزار (ایجاد رانر)

ماکسیفوس ۲۰-۴۰

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین P, K و رفع تنش و بیماری های قارچی)

اِپتِمار

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (درشتی، یکدستی و رنگ گیری میوه ها)

آهن گرین فی



با آبیاری ۵۰۰-۳۰۰ گرم در هزار متر مربع (افزایش فتوسنتز و فعالیت آنزیمی گیاه)