



تهیه نشاء



پس از انتقال نشاء



گلدهی



تشکیل میوه ها



رشد میوه ها



پس از برداشت

آمینون رای

با آبیاری نشاء (۲-۱ در هزار)

گرین کال

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (رشد میوه ها و تامین کلسیم)

اپتیمار

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (درشتی، یکدستی و کیفیت)

ماکسی پلنت هیومیک

با آبیاری ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار (اصلاح خاک، ریشه زایی و افزایش جذب مواد غذایی)

بیوکسی کلسیم

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین کلسیم، جلوگیری از ریزش گل و میوه)

بیوکسی بور

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (افزایش تلقیح گل ها)

بیوکسی میکس

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

سولویتاس مدیفر



با آبیاری ۲۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار (تکرار هر ۱۵ روز)

ماکسی پلنت سال

با آبیاری ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار (رفع شوری خاک، تامین کلسیم، بهبود جذب) - تکرار هر ۲۰ روز

ماکسیفوس ۲۰-۴۰

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین P, K و رفع تنش و بیماری های قارچی)

بیوکسی ۴ کانه

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین Zn, Cu, Mg, Mn)

آهن گرین فی



با آبیاری ۵۰۰-۳۰۰ گرم در هزار متر مربع (افزایش فتوسنتز و فعالیت آنزیمی گیاه)