



تورم جوانه ها



پس از گل دهی



تشکیل میوه



رشد میوه ها



قبل از رسیدن میوه



پس از برداشت

بالانس

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (فروت ست)

بیوکسی مس

محلول پاشی ۱ در هزار

محلول پاشی ۱ در هزار (رفع کمبود، افزایش جوانه بارده)

بیوکسی بور

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (افزایش تلقیح)

بیوکسی کلسیم

محلول پاشی ۲ در هزار (تقسیم سلولی، رشد میوه ها)

بیوکسی روی و منگنز

محلول پاشی ۲-۱ در هزار

با آبیاری ۱۰-۵ لیتر در هکتار

ایتمار

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (درشتی، یکدستی و رنگ گیری میوه ها)

بیوکسی میکس

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

فولیمکس کا

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (بهبود مزه، کیفیت و وزن گیری میوه ها)

سولوپتاس مدیفر



با آبیاری ۲۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار (۳ مرحله به فاصله ۱۵ روز)

ماکسیفوس کلسیم

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین P و Ca، رفع تنش و بیماری قارچی)

ماکسی پلنت هیومیک

با آبیاری (اصلاح خاک، ریشه زایی و افزایش جذب مواد غذایی)

آمینون فورت

محلول پاشی ۲-۱ در هزار (تامین اسید آمینه، رفع تنش، افزایش رشد)