



تورم جوانه ها



پس از گل دهی



تشکیل میوه



رشد میوه ها



قبل از رسیدن پسته



پس از برداشت

بالانس

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (فروت ست)

بیوکسی کلسیم

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (۲-۳ مرحله به فاصله ۱۵ روز)

بیوکسی بور

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (افزایش تلقیح)

گرین کال

محلول پاشی ۲ در هزار (رشد پسته ها، تشکیل پوسته سخت)

بیوکسی روی

با آبیاری ۵-۱۰ لیتر در هکتار

محلول پاشی ۱-۲ در هزار

ایتیمار

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (درشتی، یگدستی و خندانی پسته)

بیوکسی میکس

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

آهن گرین فی



با آبیاری ۳۰-۷۰ گرم / درخت (بستگی به سن، اندازه و بار درخت)

سولوپتاس مدیفر



با آبیاری ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار (۳ مرحله به فاصله ۱۵ روز)

ماکسیفوس کلسیم

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین P و Ca، رفع تنش و بیماری قارچی)

ماکسیفوس ۲۰-۴۰

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین P و K، رفع تنش و بیماری قارچی)

بیوکسی ۴ گانه

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (Zn, Cu, Mg, Mn)