



تورم جوانه ها



پس از گل دهی



تشکیل میوه



رشد میوه ها



قبل از رسیدن میوه



پس از برداشت

بالانس

محلول پاشی ۱-۲ در هزار ( فروت ست )

گرین کال

محلول پاشی ۱-۲ در هزار ( رشد میوه ها و تامین کلسیم )

اِپتیمار

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (درشتی، یکدستی و کیفیت)

ماکسی پلنت هیومیک

با آبیاری ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار (اصلاح خاک، ریشه زایی و افزایش جذب مواد غذایی)

بیوکسی روی

با آبیاری ۵-۱۰ لیتر در هکتار

محلول پاشی ۱-۲ در هزار

فولیمکس کا

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (وزن گیری و رشد میوه، افزایش کیفیت)

بیوکسی میکس

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین تمام ریز مغذی ها بصورت کمپلکس)

سولویتاس مدیفر



با آبیاری ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار (۳ مرحله به فاصله ۱۵ روز)

ماکسیفوس کلسیم

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین P و Ca، رفع تنش و بیماری قارچی)

آمینون فورت

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین اسید آمینه، رفع تنش، بهبود رشد)

بیوکسی ۴ گانه

محلول پاشی ۱-۲ در هزار (تامین Zn, Cu, Mg, Mn)